

Uso | Uso  
oral | veterinário

## Ranivet®

Comprimidos 80 mg

### FÓRMULA:

Cada comprimido contém:

Ranitidina .....80 mg

Excipiente q.s.p. ....200 mg

### INDICAÇÕES:

A ranitidina é um antagonista reversível dos receptores H<sub>2</sub>, reduz a secreção gástrica tanto do ácido clorídrico como da pepsina.





Os principais usos terapêuticos da ranitidina são: tratamento da gastrite urêmica, úlceras gástricas e duodenais, gastrites erosivas relacionadas ao stress e condições hipersecretoras, como gastrinoma ou a mastocitose sistêmica. Esse fármaco também é utilizado em distúrbios de refluxo gastroesofágico, esofagite e refluxo gastroduodenal. Na insuficiência pancreática exócrina, a ranitidina, se administrada cerca de 30 minutos antes da refeição, impede a hidrólise enzimática e ácida de substituição das enzimas pancreáticas do estômago.

A ranitidina parece ser eficiente no controle da hemorragia gastrointestinal superior quando a hemorragia não for devido a erosão de grandes vasos sanguíneos.

### MODO DE USAR:

Administrar por via oral, diretamente na boca do cão ou misturado ao alimento, segundo a posologia indicada.

### POSOLOGIA:

|                       |                   |   |
|-----------------------|-------------------|---|
| Cães até 10 kg        | 1/4 de comprimido |  |
| Cães de 10 kg a 20 kg | 2/4 de comprimido |  |
| Cães de 20 kg a 30 kg | 3/4 de comprimido |  |
| Cães de 30 kg a 40 kg | 1 comprimido      |  |

A dose recomendada para cães é de 2,0 mg de ranitidina por kg de peso corpóreo, o que corresponde à 1/4 do comprimido para cada 10 kg de peso corpóreo. Administrar duas vezes ao dia.

Na maioria dos casos a cicatrização das ulcerações ocorre em 4 semanas, após este período o animal deve ser reavaliado pelo Médico Veterinário, para identificar se há necessidade de repetir o tratamento.

As possíveis alterações da posologia recomendada, devem ser determinada pelo Médico Veterinário.

### PRECAUÇÕES:

É recomendado regular a supervisão de pacientes com úlcera péptica que estejam usando drogas anti-inflamatórias não esteroidais, especialmente idosos.

### EFEITOS COLATERAIS:

Efeitos colaterais em pequenos animais são raros. Em cães, dosagens maiores que 225 mg/kg/dia geram tremores musculares, vômitos e respiração ofegante. Outros efeitos colaterais reportados raramente incluem reações de hipersensibilidade, febre, mialgia, hepatotoxicidade e neutropenia. Ao contrário da cimetidina, a ranitidina possui pequeno efeito antiandrogênico. Tem sido reportados casos raros de bradicardia e bloqueio atrioventricular, como ocorre com outros antagonistas dos receptores H<sub>2</sub>.

### CONTRA-INDICAÇÕES:

O produto é contra-indicado em animais com hipersensibilidade conhecida à ranitidina e nos casos de insuficiência renal ou hepática severas e discrasias sanguíneas. O uso de ranitidina, bem como de outros antiulcerosos, pode ocultar sintomas associados ao câncer de estômago e assim retardar o diagnóstico da doença. Por esta razão quando houver suspeita de úlceras gástricas, o Médico Veterinário deverá excluir à possibilidade de malignidade antes de iniciar o tratamento. A ranitidina atravessa a barreira placentária e é também excretada no leite materno. Não utilizar o medicamento durante a gravidez e o aleitamento.

### INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS:

Antiácidos diminuem a absorção gastrointestinal e conseqüentemente devem ser administrados com intervalos de duas horas.

A ranitidina retarda o clearance renal da procainamida e da cisplatina em cães. A ranitidina aumenta a toxicidade da ciclosporina, gentamicina, glipizidas, metoprolol, pentoxifilina e quinidina.

### APRESENTAÇÃO:

Blister contendo 12 ou 20 comprimidos, acondicionado em cartucho, acompanhado de bula.

Conservar em local fresco e seco, ao abrigo da luz solar e fora do alcance das crianças e animais domésticos.

### VENDA SOB PRESCRIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SOB ORIENTAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO.

Licenciado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob o n° 8992 em 12/11/2004.

Responsável Técnico: Dr. Raul Eduardo Arias Palacios - CRMV/RJ n°11.293.

Proprietário e Fabricante:

 **COVELI**

COVELI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.  
Rua Ari Barroso, 458/530 - Duque de Caxias - RJ  
CEP 25085-480 - CNPJ 33.927.419/0001-42  
Indústria Brasileira - Marca Registrada  
www.coveli.com.br



Tel.: (21) 3419-7329  
0800 719 0000  
sac@coveli.com.br