

USO | USO
ORAL | VETERINÁRIO

Primociclin[®]
COMPRIMIDOS 100 mg

Antimicrobiano de largo espectro de ação para cães

FÓRMULA:

Cada comprimido contém:

Enrofloxacino 100 mg

Excipiente q.s.p 200 mg

INDICAÇÕES:

Primociclin atua contra infecções dos cães causadas por bactérias Gram-negativas e Gram-positivas, espiroquetas e micoplasmas sensíveis ao Enrofloxacino. É especialmente indicado nas:

- Infecções dérmicas (piodermites) causadas por *Staphylococcus intermedius*, *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus epidermidis*, *Escherichia coli*, *Pseudomonas spp.* e *Proteus mirabilis*.
- Infecções respiratórias (pneumonias) causadas por *Pasteurella spp.*, *Escherichia coli*, *Streptococcus spp.*, *Klebsiella spp.*, *Bordetella bronchiseptica*, *Staphylococcus aureus*, *Pseudomonas spp.* e *Mycoplasma spp.*
- Infecções entéricas (diarreias) primárias ou secundárias causadas por *Escherichia coli*, *Campylobacter spp.* e *Salmonella spp.*
- Infecções do ouvido (otites) causadas por *Pseudomonas spp.*, *Staphylococcus spp.*, *Streptococcus spp.* e *Proteus spp.*
- Infecções geniturinárias causadas por *Escherichia coli*, *Staphylococcus spp.*, *Proteus spp.*, *Streptococcus spp.*, *Enterobacter spp.*, *Brucella spp.*, *Mycoplasma spp.* e *Klebsiella spp.*
- É também indicado na profilaxia das infecções pós-operatórias como castrações, laparotomias e lesões acidentais.

VIA DE ADMINISTRAÇÃO E MODO DE USAR:

Via oral, puro ou misturado a alimentos sólidos, de acordo com o peso do animal a ser tratado.

POSOLOGIA:

A dose média recomendada é de 5,0 mg de Enrofloxacino por kg de peso, sendo: 1 comprimido de Primociclin 100 mg para cada 20 kg de peso vivo uma vez ao dia.

QUANDO NECESSÁRIO PARTIR O COMPRIMIDO UTILIZÁ-LO EM ATÉ 72 HORAS.

DURAÇÃO DO TRATAMENTO:

De 3 a 5 dias consecutivos, sendo recomendado prolongar o tratamento por, no mínimo, 48 horas após o desaparecimento dos sintomas. As possíveis alterações da posologia recomendada, devem ser determinadas pelo Médico Veterinário.

CONTRA-INDICAÇÕES:

Não administrar o produto a cães de raças pequenas e médias, no período de 2 a 8 meses de idade (fase de crescimento rápido). Nas raças grandes este período pode chegar a 18 meses. Não administrar em fêmeas prenhes. Evitar o uso na lactação.

EFEITOS COLATERAIS:

Podem ocorrer náuseas, vômitos, elevação das transaminases, pruridos e urticárias nos animais sensíveis. Erosão das cartilagens nos animais em fase de crescimento.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS:

Evitar o uso associado de quinolonas com complexos vitamínicos ou soluções que contenham ferro, zinco, manganês e cálcio pois eles reduzem a absorção do enrofloxacino. Não administrar concomitantemente com teofilina, a interação envolve inibição competitiva na metabolização do enrofloxacino.

APRESENTAÇÃO:

Blistar contendo 10 ou 20 comprimidos, acondicionados em cartucho.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO.

Conservar em local seco, fresco, ao abrigo da luz solar direta e fora do alcance das crianças e animais domésticos.

Responsável Técnico: Dr. Raul Eduardo Arias Palacios - CRMV-RJ nº 11293.

Licenciado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob o nº RJ 0001031 000001 em 06/09/2019.

Proprietário e Fabricante:



COVELI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Rua Ari Barroso, 458/530 - Duque de Caxias - RJ
CEP 25085-480 - CNPJ 33.927.419/0001-42
Indústria Brasileira - Marca Registrada
www.coveli.com.br



Tel.: (21) 3419-7329
0800 719 0000
sac@coveli.com.br